

Số: /CV-DVKTNN

Lục Ngạn, ngày tháng 4 năm 2023

V/v phòng, trừ sâu đục cuống
quả lúa 3

Kính gửi:

- Hội nông dân huyện;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cán bộ Khuyến nông, thú y cơ sở.

Hiện nay, các trà Vải đang bước vào thời kỳ phát triển quả; đây là thời điểm rất quan trọng trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại, đặc biệt là sâu đục cuống quả vải. Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Lục Ngạn; giai đoạn này sâu đục cuống quả trưởng thành lúa 3 đang phát sinh mạnh trên các trà vải, dự báo sẽ nở rộ vào thời gian từ ngày 18 đến 25/4/2023; với mật độ trung bình từ 2 đến 3 con trên cành; mật độ cao từ 3 đến 5 con trên cành; (*đặc biệt là ở những vườn rậm rạp và trên trà vải sớm như: U hồng, Thanh hà...*); nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây hại nặng trên vải sớm giai đoạn chín cùi đến tròn quả, vải chính vụ giai đoạn phát triển hạt, hình thành cùi và gia tăng phát triển gây hại các giai đoạn sau làm ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng quả vải.

Để kịp thời phòng, trừ tốt sâu đục cuống quả trên vải, Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Biện pháp phòng trừ

1.1. Biện pháp cơ giới

- Thường xuyên kiểm tra vườn, kịp thời phát hiện sâu đục cuống quả sớm. Tỉa cành thông thoáng cho cây vải (*tỉa cành cả những cây không đậu quả và cả những cây khác trong vườn*), vệ sinh vườn, phát quang bờ rào, cỏ dại, tiến hành thu gom quả thối, quả rụng đem tiêu hủy để hạn chế nguồn sâu đục gây hại trú ngụ trên cây và trong vườn;

- Bón phân NPK cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh giúp cây sinh trưởng tốt, tăng cường sức đề kháng cho cây.

1.2 Biện pháp hóa học:

- Trưởng thành sâu đục cuống lúa 3 đang ra rộ (*có hiện tượng gổỉ lúa*), sâu non lúa 4 bắt đầu phát sinh và gây hại quả. Tiến hành phun sâu đục cuống kép 2 lần: lần 1 phun từ ngày 20 -26/4; lần 2 phun cách lần 1 từ 5-7 ngày bằng một trong những hoạt chất như: Emamectin, Abamectin, Azadirachtin,...các loại thuốc như: Tasieu 1.9EC, Mikmire 2.0EC, Minup 0.3EC,Sudoku 22EC,...

2. Kỹ thuật phun thuốc

Phun vào buổi chiều mát, phun kỹ trên và trong tán cây, đặc biệt trên cành cấp hai, cấp ba (*trưởng thành sâu đục cuống quả vải tập trung ở trong tán cây, trên cành cấp hai, cấp ba*) để mang lại hiệu quả phòng trừ tốt với đối tượng sâu đục cuống quả.

Đề nghị Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp tuyên truyền; UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo.

Yêu cầu cán bộ Khuyến nông, thú y cơ sở thường xuyên đi kiểm tra các vùng sản xuất, tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn nhân dân phòng trừ tốt sâu đục cuống lúa 3./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- TTHU; TT UBND huyện (B/c);
- Hội Nông dân, Phòng NN&PTNT, Trung tâm VH-TT&TT huyện (P/h);
- UBND các xã, thị trấn (P/h);
- Cán bộ Khuyến nông cơ sở các xã, thị trấn (T/h).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lâm Thị Hà